

Objectifs : L'Autorisation de mise en marché et la Protection des nouvelles variétés
Protocole technique de l'O.C.V.V. (TP/049/3) 31 caractères d'observations

TYPOLOGIE



Type Beurre



Type Novita




Type Iceberg



Type Batavia



Type Frisée d'Amérique



Type Lollo



Type Feuille de chêne



Type Multi-divisé



Type Frillice



Type Romaine



Type Grasse




Type Tige

Variétés à pomme fermée seulement: Pomme: degré du chevauchement de la partie supérieure des feuilles



absent ou faible



moyen



fort

Limbe: nervation



non flabelliforme



semi flabelliforme



flabelliforme

Plante: intensité de la fasciation à la montaison



absente ou très faible



faible



moyenne



forte



très forte

Résistance à *Bremia lactucae* : échelle de notation

Résistant



Pas de sporulation + pas de nécrose



Pas de sporulation + nécroses



Sporulation faible (bien moins que le témoin sensible) + nécroses



Sporulation faible (moins que le témoin sensible et n'évoluant pas entre la 2^{ème} et 3^{ème} notation) + nécroses



Dans certains cas sporulation légère peut apparaître (sans nécrose) et n'évoluant pas entre la 2^{ème} et 3^{ème} notation)

Sensible



Sporulation réduite (en comparaison du témoin sensible) + pas de nécrose



Sporulation normale + pas de nécrose

Autre cas



Sporulation normale (identique au témoin sensible) + nécroses

→ dans ce cas, un autre test sur des plantes plus âgées ou un autre substrat doit être réalisé pour pouvoir conclure